



Fungicida/ Suspensión concentrada

FICHA TÉCNICA

A. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTES ACTIVOS:	% EN PESO
Azufre elemental: Azufre elemental (Equivalente a 615 g de i.a./L a 20°C)	50.00
Oxiclورو de cobre: “Con un contenido de cobre como elemento no menor al 59%” (Equivalente a 54.12 g de i.a./L a 20°C)	7.46
INGREDIENTES INERTES: Dispersante, anticongelante, antiespumante, espesante y diluyente.	42.54
TOTAL	100.00

REG.: RSCO-MEZC-1324-305-064-057

®Marca Registrada de una Compañía del Grupo Syngenta.

Categoría Toxicológica 5

B. CARACTERÍSTICAS

Sulfocop F® es un producto fungicida para uso agrícola recomendado en la prevención y control de las enfermedades que se indican más adelante.

C. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:	Suspensión acuosa de color azul - verde
Olor:	Ligero
pH:	ND
Densidad:	ND
Temperatura de inflamación:	No flamable
Temperatura de autoignición:	ND
Temperatura de ebullición:	ND
Solubilidad en agua:	ND
Velocidad de evaporación:	ND
Porcentaje de volatilidad:	ND

D. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS LT/Ha	OBSERVACIONES
Calabacita Sandía Melón Pepino Calabaza (S/L)	Cenicilla <i>(Erysiphe cichoracearum)</i>	2.5 – 3.5 L/ha	Inicie las aplicaciones a los 30 días y continúelas a intervalos de 7 a 10 días. Calibre el equipo de aplicación para un gasto de 200 a 400 litros de agua/ha, con equipo aéreo entre 60 y 80 litros de agua/ha.
Aguacate (S/L)	Antracnosis <i>(Colletotrichum gloesporioides)</i>	0.3 L / 100 L de agua	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 10 días, volumen de aplicación 1000 L/ha.
Jitomate Tomate de cáscara Chile Papa Berenjena (SL)	Cenicilla <i>(Leveillula taurica)</i>	2.5 – 3.5 L/ha	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 500 L de agua/ha.

() = Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL = Sin Límite

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

E. MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Forma de abrir el envase: Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y los ojos.

Preparación: Sulfocop F[®] debe aplicarse en suficiente agua para lograr una cobertura total y uniforme. Se recomienda hacer una premezcla en una cubeta con agua y agregarla a un tambo de 100 litros con agua hasta la mitad, completar con agua el tambo y mezclar perfectamente. Agitar la mezcla cada vez que vuelva a llenarse el equipo aspersor.

F. CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso, en contra del viento, ni cuando exista alta probabilidad de lluvia.

G. FITOTOXICIDAD

Sulfocop F[®] no es fitotóxico si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

H. INCOMPATIBILIDAD

No se aplique este producto en mezcla con aceites; tampoco se aplique en cultivos que hayan sido tratados con emulsiones de aceite, debiendo esperar de 3 a 4 semanas para hacerlo. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla deberá hacerse una prueba previa a su aplicación. Las mezclas que se realicen deben ser con productos registrados.

I. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y APLICADOR

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DE PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE DERRAMES SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Al preparar o mezclar



Al aplicar



Después de aplicar



Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a:

Syngenta Agro, S.A. de C.V
 Insurgentes Sur 1431 Piso 12
 Col. Insurgentes Mixcoac, 03920
 Ciudad de México
 Tel: (55) 9183 9100

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a:

Asesoría médica en caso de
 intoxicación.
 Atención sin costo
 24 horas

