

FICHA TÉCNICA

A. DATOS DEL PRODUCTO

“Composición Garantizada”

Nitrógeno total (N).....	3.6	%p/v
1.2 %p/v Nitrógeno (N) orgánico		
2.4 %p/v Nitrógeno (N) uréico		
Potasio (K ₂ O) soluble en agua	3.6	%p/v
Carbono (C) orgánico	12.0	%p/v
Manganeso (Mn) quelatado por EDTA.....	0.6	%p/v
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0.24	%p/v
Zinc (Zn) quelatado por EDTA	0.6	%p/v
L-Fucosa	0.206	%p/p
Acido Fítico	0.222	%p/p
D-Manitol	0.260	%p/p

No de REGISTRO: RSCO-297/VI/23

Titular del Registro: VALAGRO MEXICANA, S.A. DE C.V.
Distribuido por: SYNGENTA AGRO, S.A. de C.V.

B. INFORMACIÓN GENERAL / CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

YIELDON VALAGRO es un producto de aplicación foliar para la nutrición de las plantas, capaz de aumentar la productividad de los cultivos extensivos.

Beneficios de aplicación de **YIELDON VALAGRO** a los cultivos:

- Favorece la producción de hojas y granos.
- Acorta los días a floración y fructificación, que ayuda a la obtención temprana de las cosechas.
- Favorece el tamaño y peso de los granos, así como el rendimiento.
- Influye en la producción de proteínas en los granos.

B. RECOMENDACIONES DE USO: APLICACION FOLIAR

Cultivo	Dosis L/ha	Época de Aplicación
Trigo	1 - 2	En la fase de la hoja bandera
Maíz	1 - 2	En la fase de crecimiento V4-V6
Algodón	1 - 2	A los 30 días (desarrollo vegetativo) y 120 días (floración) después de la emergencia
Soja	1 - 2	En Vn / R1 y la segunda en R3 / R4
Arroz	1 - 2	Al inicio de la fase de hoja bandera
Girasol	1 - 2	Al inicio de la fase de crecimiento V4-V6
Haba	1 - 2	En R5 y R7
Frijol	1 - 2	En desarrollo vegetativo y floración

D. PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 L.

E. MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

El envase debe abrirse en el sitio de la aplicación del producto, cuidando de llevar puesto el equipo de protección personal indicado en el apartado de "PRECAUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de la etiqueta. Desenrosque la tapa del envase y retire el sello de seguridad. De ser necesario con el apoyo de una jarra graduada específica para este producto, mida la dosis que desea aplicar. En el tanque de mezcla incorpore el agua a utilizar, adicione la dosis de **YIELDON** y agite hasta su completa homogenización. En el equipo de aplicación previamente calibrado, incorpore la mezcla y asegúrese de cubrir toda el área foliar.

El producto no presenta problemas de conservación si se almacena a una temperatura comprendida entre 0°C y 35°C.