



Acaricida e Insecticida/ Concentrado Emulsionable

## FICHA TÉCNICA

### A. GENERALIDADES DEL PRODUCTO

#### “COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTES ACTIVOS:	% EN PESO
<b>Extracto de cítricos</b> <i>Citrus sinensis</i> (Equivalente a 240 g de limoneno/L a 20°C)	25.00
<b>Extracto de canela</b> <i>Cinnamomum zeylacum</i> (Equivalente a 67 g de cinamaldehído/L a 20°C)	7.00
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Emulsificador, estabilizador y diluyente.	68.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

REG.: **RSCO-MEZC-INAC-1301L-0104R-X005-375-32.0**

Titular del Registro e Importador: GRUPO AGROTECNOLOGÍA MÉXICO TCB E IBERFOL, S.A. DE C.V.  
Distribuidor: SYNGENTA AGRO, S.A. DE C.V.

**Categoría Toxicológica 5**

### B. CARACTERÍSTICAS

**Candor®** es un plaguicida botánico a base de Extracto de Cítricos y Extracto de canela que actúa sobre las plagas y los cultivos que más adelante se indican.

### C. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

<b>Aspecto:</b>	Líquido de color amarillento
<b>Olor:</b>	Característico
<b>pH:</b>	8.5±0.5
<b>Densidad relativa:</b>	0.960±0.005 g/cm <sup>3</sup>
<b>Punto de inflamación:</b>	Sin datos disponibles
<b>Punto de fusión:</b>	Sin datos disponibles
<b>Solubilidad:</b>	Sin datos disponibles
<b>Propiedades explosivas:</b>	Sin datos disponibles
<b>Propiedades comburentes:</b>	Sin datos disponibles

## D. RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Fresa, Zarzamora, Grosella, Frambuesa, Arándano (SL)	Araña roja ( <i>Tetranychus urticae</i> )	2.0-4.0 mL/L de agua	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros individuos plaga sobre las plantas; volumen de aplicación 450-500 L de agua/ha.
Pepino, Melón, Sandía, Calabaza, Chayote, Chilacayote (SL)	Mosquita blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	2.0-4.0 mL/L de agua	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros individuos plaga sobre las plantas; volumen de aplicación 450-500 L de agua/ha.
Jitomate, Chile, Chile Bell, Berenjena, Tomate de cáscara, Papa, Tabaco (SL)	Mosquita blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> )	3.0-4.0 mL/L de agua	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros individuos plaga sobre las plantas; volumen de aplicación 450-500 L de agua/ha.
Pepino, Melón, Sandía, Calabaza, Calabacita, Chayote, Chilacayote (SL)	Araña roja ( <i>Tetranychus urticae</i> )	2.0-4.0 mL/L de agua	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros individuos plaga sobre las plantas; volumen de aplicación 150-250 L de agua/ha.
Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor, Rábano, Nabo, Berro. (SL)	Pulgón cenizo ( <i>Brevicoryne brassicae</i> )	2.0-4.0 mL/L de agua	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros individuos plaga sobre las plantas; volumen de aplicación 250-350 L de agua/ha.

**Tiempo de reentrada a la zona tratada:** Una vez que seque el producto.

**( ) = Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**SL = Sin Límite**

### “MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

## E. MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante el manejo de este producto, siempre, use el equipo de protección descrito en la sección “precauciones y advertencias de uso”. El producto **Candor®** debe abrirse en el lugar de trabajo, girando la rosca hasta romper el arillo. Agregue la mitad de la cantidad de agua requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para



mantener una solución uniforme. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar. Realice las aplicaciones a favor del viento.

## F. CONTRAINDICACIONES

No aplicar en horas de calor intenso ni con vientos mayores a 15 km/h, o cuando esté próxima la lluvia. Aplique a favor del viento.

## G. FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a la dosis y recomendaciones de la etiqueta.

## H. INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda **Candor**<sup>®</sup> con otros plaguicidas.

## I. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y APLICADOR

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DE PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRANEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE DERRAMES SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

## PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUAANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"



## USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL



Preguntas referentes al manejo seguro del producto se deben dirigir a:

Syngenta Agro, S.A. de C.V.  
Insurgentes Sur 1431 Piso 12  
Col. Insurgentes Mixcoac, 03920  
Ciudad de México  
Tel: (55) 9183 9100

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a:

